

化学療法（ナリボソーム化イリノテカン + レボホリナート + 5-FU）

ID ()	患者名 ()		
生年月日 ()	年齢 ()		回目 ()
身長 ()cm		オニバイド投与量 (70mg/m ²) : ()	mg/body
体重 ()kg		レボホリナート投与量 (200mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²		5-FU(持続)投与量 (2400mg/m ²) : ()	mg/body

Day 1	①	①
	グラニセロンバッグ(100mL) 1V デカドロン(8mg) 1V 点滴静注 100mL/hr	イメンド(125mg) 1C
	②	
	オニバイド ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1V 点滴静注 350mL/hr	
	③	
	生理食塩液(50mL) 1V フラッシュ用 (0.5V以上で途中終了可)	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">2週間</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;">2週に1回投薬 以上を可能な限り繰り返す</div>
④		
	レボホリナート ()mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1V 点滴静注 125mL/hr	
⑤		
	5-FU ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1V 点滴静注 46時間	
Day 2		⑥
	5-FU継続	イメンド(80mg) 1C 午前中 デカドロン(0.5mg) 朝 4T デカドロン(0.5mg) 昼 4T
Day 3		⑧
	生理食塩液(50mL) 1V フラッシュ用	イメンド(80mg) 1C 午前中 デカドロン(0.5mg) 朝 4T デカドロン(0.5mg) 昼 4T
	終了	