


## 化学療法（ABVd）

ID ( )	患者名 ( )	( )	クール目
生年月日 ( )	ドキソルピシン投与量 (25mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body
身長 ( )cm	プレオ投与量 (9mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body
体重 ( )kg	イクザール投与量 (6mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	ダカルバジン投与量 (250mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body

レジメ	メインルート	内服
	①	
	生理食塩液(100mL) 1本	イメンドカプセルセット 1日目
	アロキシ(0.75mg) 1本	
	デカドロン(8mg) 1本	
	デカドロン(2mg) 2本	
	点滴 1時間	
	②	
	ドキソルピシン ( )mg	
	生理食塩液(50mL) 1本	
	点滴 15分	
	③	
	プレオ ( )mg	
	生理食塩液(100mL) 1本	
	点滴 30分	
	④	
	イクザール ( )mg	
	生理食塩液(100mL) 1本	
	点滴 30分	
	⑤	
	生理食塩液(50mL) 1本	
	点滴 約 15分	
	⑥	
	ダカルバジン ( )mg	
	注射用水(20mL) 2本	
	5%ブドウ糖液(100mL) 1本	
	点滴 約 45分	
	⑦	
	生理食塩液(50mL) 1本	
		<b>内服</b>
		イメンドカプセルセット 午前中
		デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠
		昼 4錠
		(点滴翌日より 2日間)



ドキソルピシン・プレオマイシン・ビンブラスチン  
 およびダカルバジンは1日目と15日目  
 イメンド内服は点滴日より3日間  
 デカドロン内服は点滴翌日より2日間  
 以上4週間で1クール、合計6～8クール施行