

## 化学療法 (CHOP)

ID (	)	患者名(	) (		)クール目
生年月日(	)	オンコビン技	没与量 (1.4mg/m²) :(		)mg/body
身長(	)cm	アドリアシン	投与量 (50mg/m²) :(		)mg/body
体重(	)kg	エンドキサン投	と与量 (750mg/m²) :(		)mg/body
体表面積(	)m²	プレドニゾロン1	日投与量 (100mg): (	100	)mg/body

レジメ メインルート (1) 生理食塩液(100mL) 1本 アロキシ(0.75mg) 1本 水溶性プレドニン ( 100 ) mg 点滴 30分 オンコビン ) mg 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 15分 (3) ドキソルビシン ) mg 生理食塩液(100mL) 1本 点滴 30分 4 エンドキサン ) mg 生理食塩液(250mL) 1本 点滴 1時間 **(5)** ソルデム3A(500mL) 1本 メイロン(20mL) 1本



## 4日間内服

16日間休薬

ビンクリスチン・ドキソルビシン・シクロホスファミドは CHOP初日のみ プレドニゾロンはCHOP初日に点滴、翌日より4日間内服 以上3週間で1クール、合計6~8クール施行

※ プレドニゾロンは省略されることがあります

内服

点滴

プレドニゾロン錠(5mg) 朝 12錠 昼 8錠 (2日目 ~ 5日目)

2時間