

化学療法 (THP-COP)

ID ()	患者名 ()	()	クール目
生年月日 ()	オンコピン投与量 (1.4mg/m ²) :	()	mg/body
身長 ()cm	ピルビン投与量 (50mg/m ²) :	()	mg/body
体重 ()kg	エンドキサン投与量 (750mg/m ²) :	()	mg/body
体表面積 ()m ²	プレドニゾン1日投与量 (100mg) :	(100)	mg/body

レジメ

メインルート

①

生理食塩液 (100mL)	1本
アロキシ (0.75mg)	1本
水溶性プレドニン (100)mg	

点滴 30分

②

オンコピン ()mg	
生理食塩液 (50mL)	1本

点滴 15分

③

ピルビン ()mg	
5%ブドウ糖液 (100mL)	1本

点滴 30分

④

エンドキサン ()mg	
生理食塩液 (250mL)	1本

点滴 1時間

⑤

ソルデム3A (500mL)	1本
メイロン (20mL)	1本

点滴 2時間

内服

プレドニゾン錠 (5mg) 朝 12錠
 屋 8錠
 (2日目 ~ 5日目)

点滴 ↓

4日間内服 → 16日間休薬

ビンクリスチン・ピラルピシン・シクロホスファミドは
 THP-COP初日のみ
 プレドニゾンはTHP-COP初日に点滴、翌日より4日間内服
 以上3週間で1クール、合計6~8クール施行

※ プレドニゾンは省略されることがあります