化学療法 (5-FU + Full Dose シスプラチン + RT併用)

ID ()	患者名 ()		
生年月日 ()	年齢 ()		()クール目
身長 ()cm		Cr ()	mg/dL
体重 ()kg		シスプラチン投与量 (60mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²		5-FU投与量 (600mg/m ²) : ()	mg/body

レジメ

1日目	2日目 ~ 5日目
メインルート	内服
① ソルデム1 (200mL) 1本 硫酸Mg (20mL) 0.5本 点滴 約 50分	① イメンドカプセル (80mg) 1個 午前中 (2日目と3日目のみ)
② 5%ブドウ糖液 (250mL) 1本 アロキシ (0.75mg) 1本 デカドロン (8mg) 1本 デカドロン (2mg) 2本 点滴 1時間	メインルート
	① 5-FU mg ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 24時間
	側管
③ ソルデム3A (500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 1時間半	③ イメンドカプセル (125mg) 1個
	① 生理食塩液 (100mL) 1本 デカドロン (8mg) 1本 点滴 30分
④ シスプラチン ()mg 生理食塩液 (500mL) 1本 合計600mLにして使用 点滴 2時間	② ソルデム3A (500mL) 1本 点滴 2時間
	側管
⑤ 5-FU ()mg ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 翌朝まで	⑤ ソルデム3A (500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 約 2時間半
	⑥ ソルデム3A (500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 約 2時間半
	6日目
	メインルート
	① 生理食塩液 (50mL) 1本

投薬

1週間

3週間

1週 (5日間) 投薬、3週休薬
 4週間で1クール、合計2クール施行