


化学療法 (5-FU + Full Dose シスプラチン)

ID ()	患者名 ()		
生年月日 ()	年齢 ()		()クール目
身長 ()cm		Cr ()	mg/dL
体重 ()kg		シスプラチン投与量 (80mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²		5-FU投与量 (800mg/m ²) : ()	mg/body

レジメ

1日目	2日目 ~ 5日目
<p>メインルート</p> <p>① ソルデム1 (200mL) 1本 硫酸Mg (20mL) 0.5本 点滴 約 50分</p> <p>② 5%ブドウ糖液 (250mL) 1本 アロキシ (0.75mg) 1本 デカドロン (8mg) 1本 デカドロン (2mg) 2本 点滴 1時間</p> <p style="text-align: center;">内服</p> <p>③ ソルデム3A (500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 1時間半</p> <p>④ シスプラチン ()mg 生理食塩液 (500mL) 1本 合計600mLにして使用 点滴 2時間</p> <p style="text-align: center;">側管</p> <p>⑤ 5-FU ()mg ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 翌朝まで</p>	<p>内服</p> <p>① イメンドカプセル (80mg) 1個 午前中 (2日目と3日目のみ)</p> <p>メインルート</p> <p>① 5-FU mg ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 24時間</p> <p style="text-align: center;">側管</p> <p>① 生理食塩液 (100mL) 1本 デカドロン (8mg) 1本 点滴 30分</p> <p>② ソルデム3A (500mL) 1本 点滴 2時間</p> <p>③ ソルデム3A (500mL) 1本 点滴 2時間</p>
<p style="text-align: center;">側管</p> <p>⑥ ソルデム3A (500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 約 2時間半</p>	<p>6日目</p> <p>メインルート</p> <p>① 生理食塩液 (50mL) 1本</p>



1週 (5日間) 投薬、3週休薬
 4週間で1クール、合計6クール施行