

化学療法 (5-FU + ネダプラチン + ニボルマブ)

ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	クール目
身長 ()cm	オプジーボ投与量 (240mg/body) :	()mg/body
体重 ()kg	アクプラ投与量 (80mg/m ²) :	()mg/body
体表面積 ()m ²	5-FU投与量 (800mg/m ²) :	()mg/body

レジメ	1日目	2日目 ~ 5日目
	メインルート ① 生理食塩液(100mL) 1本 点滴 30分 ② オプジーボ ()mg 生理食塩液(100mL) 1本 点滴 30分 ③ 生理食塩液(50mL) 1本 ④ 生理食塩液(100mL) 1本 パロノセトロン(0.75mg) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分 ⑤ アクプラ ()mg 生理食塩液(500mL) 1本 点滴 2時間	メインルート ① 5-FU ()mg ソルアセトD(500mL) 1本 点滴 24時間 側管 ① 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分 ② ソルデム1(500mL) 1本 点滴 2時間
		6日目 メインルート ① 生理食塩液(50mL) 1本
同時に	⑥ 5-FU ()mg ソルアセトD(500mL) 1本 点滴 翌朝まで 側管 ⑥ ソルデム1(500mL) 1本 点滴 2時間	

