

化学療法（DCF：ドセタキセル＋シスプラチン＋5-FU）

ID ()	患者名 ()	()	クール 目
生年月日 ()	年齢		
身長 ()cm	ドセタキセル投与量 (60mg/m ²) :	()	mg/body
体重 ()kg	シスプラチン投与量 (6mg/m ²) :	()	mg/body
体表面積 ()m ²	5-FU投与量 (350mg/m ²) :	()	mg/body

レジメ

1 日 目	メインルート		
	① グラニセロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分		
	② ドセタキセル ()mg 生理食塩液(100mL) 1本 点滴 1時間半	側管 ②' 5-FU ()mg ソルアセトD(500mL) 1本 点滴 翌朝まで	
	③ シスプラチン ()mg 生理食塩液(100mL) 1本 点滴 2時間	投薬 1週間 → 2週間 1週(5日間)投薬、2週休薬 3週間で1クール 2クール施行後、継続判断	
2 日 目 5 日 目	① グラニセロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分		①' 5-FU ()mg ソルアセトD(500mL) 1本 点滴 24時間
	② シスプラチン ()mg 生理食塩液(100mL) 1本 点滴 2時間		
	③④ ソルデム3A(500mL) 2本 点滴 翌朝まで		(通常4日目の開始前に採血があります)
6 日 目	①' 生理食塩液(50mL) 1本		
終了			