

ID ()	患者名 ()	()	クール 目
生年月日 ()	年齢		
身長 ()cm	ドキシソルビシン投与量 (30mg/m ²)	: ()	mg/body
体重 ()kg	シスプラチン投与量 (7mg/m ²)	: ()	mg/body
体表面積 ()m ²	5-FU投与量 (350mg/m ²)	: ()	mg/body

レジメ

1 日 目	メインルート		投薬	
	① グラニセトロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本		1週間 3週間	
	点滴 30分		1週(5日間)投薬、3週休薬 4週間で1クール 2クール施行後、継続判断	
	② ドキシソルピシン ()mg 生理食塩液(100mL) 1本			
	点滴 30分			
③ シスプラチン ()mg 生理食塩液(100mL) 1本				
		側管	③'	5-FU ()mg ソルアセトD(500mL) 1本
点滴 2時間		点滴 翌朝まで		
④⑤ ソルデム3A(500mL) 2本				
点滴 翌朝まで				
2 日 目 5 日 目	① グラニセトロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本		①' 5-FU ()mg ソルアセトD(500mL) 1本	
	点滴 30分		点滴 24時間	
	② シスプラチン ()mg 生理食塩液(100mL) 1本			
	点滴 2時間			
	③④ ソルデム3A(500mL) 2本		(通常4日目の開始前に採血があります)	
点滴 翌朝まで				
6 日 目			①' 生理食塩液(50mL) 1本	
	終了			